

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 189
du 11 Février 1991

: <u>VIGNE</u> =	Rappel de l'utilisation réglementaire de SIMAZINE	:
:		:
: <u>ARBORICULTURE</u> =	Cloque et Pucerons - Monilia et Botrytis	:
:		:
: <u>AGRUMES</u> =	Traitement après taille	:
:		:
: <u>CULTURES MARAICHERES</u> =	Desherbage de Pomme de terre	:
:		:

VIGNE

En rappel du bulletin technique n° 185 du 7/12/90, il convient de ne pas oublier les directives de la nouvelle réglementation sur l'utilisation de la SIMAZINE, en date du 13/7/90 qui impose de ne pas dépasser la dose de 1500 gr/ha par an.

ARBORICULTURE

**** Cloque du pêcher (rappel)**

Surveiller les variétés précoces, le stade sensible de contamination se situe lorsque l'on aperçoit une **petite pointe verte** ou rougeâtre sur le dessus du bourgeon à bois comme il a été indiqué dans le bulletin n° 188.

Si le stade phénologique est trop avancé, préférer un fongicide de synthèse (Captane, Ferbame, Thirame, Zirame).

**** Pucerons**

Il semblerait que les pucerons verts deviennent de plus en plus résistants aux insecticides notamment lorsqu'ils pullulent au printemps et en début d'été. Ne pas oublier que le succès de la lutte contre cet insecte se décide avant le débourrement par la destruction des oeufs d'hiver avec D.N.O.C.

Si le stade C/D est atteint, préférer :

- Un oleoblodan à 0,6 l/hl de Produit commercial
- Oleathion S à 1 l/hl de P.C.
- Pacol 4,5 à 1,5 l/hl de P.C.
- Ugecoil 8 à 1,5 l/hl de P.C.

- Mouiller abondamment

- Attention les pucerons nouvellement éclos vont pénétrer à l'intérieur des fleurs, et sont plus difficiles à atteindre. Ne plus traiter pendant la Floraison.



Stade
C

Amandiers

Stade
G



- Monilia : sur bouquets floraux
- Botrytis : fréquent en CORSE

Le stade actuel se situe à C calice visible

Si le cuivre n'a pas été appliqué, préférer l'une des spécialités commerciales suivantes, renouveler pendant la floraison et ce jusqu'au stade G en cas de pluie.

Matière Active	Produit Commercial	Dose Hectolitre	Commercialisée Par
BENOMYL	BENLATE	0,06 kg	DUPONT
	BENLATE 50 DF	0,06 kg	DUPONT
BITERTANOL	BAYCOR 300 EC	0,100 l	BAYER
CARBENDAZIME	DANDOMIL	0,06 l	SANDOZ
HEXAICONAZOLE	ANVIL liquide	0,06 l	SOPRA
IPRODIONE	VIDAM	0,3 l	RHODIAGRIE
	ROVRAL	0,150 l	
PYRIFENOX	DORADO	0,025 l	LA QUINOLEINE
MYCLOBUTANIL	SYSTHANE 12 E	0,06 l	ROHM/PROCIDA
PROCYMIDONE	SUMISCLEX L	0,150 l	SOPRA
TRIFORINE	MBS Spécialités		
TRIADIMENOL	BAYTAM 5 L	0,2 l	BAYER
THIOPHANATE + Methyl	PELT 44 L	0,15 l	PROCIDA
VINCHLOZOLINE	RONILAN FL DF	0,1 kg	B.A.S.F.

AGRUMES

Quelques jours après la taille, en période sèche, pulvériser abondamment un cuivre (pour lutter contre les maladies bactériennes) à 0,500 grs de cuivre métal/hl. Ajouter une huile.


- OLIOCIN	=	Huiles de pétrole	à	1%
- EUPHYTANE	=	"	"	à 1% 2%
- SEPPIC ETE	=	"	"	à 1%
- QUIPRON	=	"	"	à 1%

CULTURES MARAICHÈRES

** Pommes de terre

Faire prégermer en clayette dans un local lors gel.

Utiliser des semences saines
conserver les étiquettes des sacs.



** Desherbage

En règle général, un seul desherbage appliqué après la plantation avant la levée et après buttage suffit.

** Desherbants

LINURON = N. SP.
une semaine après plantation

LINURON + TERBACILE = (solarex)
abaissier la dose à 0,9 kg/ha en sols légers

LINURON + MONOLINURON = N. SP de 2 à 3 kg/ha

METOBROMURON (patoran)
parfois des risques de phytotoxicité

METRIBUZINE (Sencoral)

Attention

Cet herbicide est un bon antigraminées , cependant on a enregistré encore l'an passé des accidents de végétation, sur variétés sensibles telles que :

- EDZINA
- SPARTAN
- ZAERLA

Dans ce cas se renseigner avant l'emploi ainsi que pour les cultures suivantes = choux fleurs, haricots.

=====